

# ATLAVAC H9N2

Vaccin à virus inactivé adjuvé contre l'Influenza aviaire sous type H9N2, souche Maroc 1/16



*Emulsion injectable*



## COMPOSITION : Par dose vaccinale :

- Virus inactivé de l'Influenza aviaire sous type H9N2, souche Maroc 1/16.....min  $10^7$  DIO<sub>50</sub> avant inactivation\*

\* Dose minimale induisant un titre sérologique inhibant l'hémagglutination  $\geq 5 \log_2$ .

- Excipient .....qsp ..... 1 dose

## INDICATIONS :

Immunisation active des espèce poule et dinde contre l'Influenza aviaire sous type H9N2.

## ADMINISTRATION ET POSOLOGIES :

Le vaccin est administré par voie intramusculaire au niveau du bréchet, ou par voie sous cutanée dans la partie basse du cou.

L'injection par voie sous cutanée est pratiquée en pinçant entre le pouce et l'index la peau au niveau de la partie basse du cou, puis introduction de l'aiguille sous la peau dans le sens inverse de la tête et injection de la dose recommandée.

o Poulet de chair : Administrer une dose de **0,25ml** par oiseau, au cours de la première semaine d'âge.

o Poulettes futures pondeuses et futures reproductrices : Administrer **une dose de 0.25ml** par oiseau au cours de la première semaine d'âge et un rappel de **0,3 ml par dose**, 4 semaines avant l'entrée en ponte.

o Dinde :

### Primo vaccination :

- Première injection de **0,3ml** par oiseau, au cours de la première semaine d'âge.

(NB : les dindonneaux issus de mères vaccinées, il est préférable de pratiquer la primo injection vers le 12 ème jour d'âge).

- Deuxième injection sera réalisée vers le 30ème jour d'âge à la dose de **0,5ml**.

### Rappel

Un rappel à la dose de **0,5 ml** par sujet est recommandé vers le 60 ème jour d'âge pour les mâles.

**TEMPS D'ATTENTE :** Zéro jour.

## CONDITIONS DE CONSERVATION :

- 2 ans à une température comprise entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière.

- Après ouverture : Utilisation immédiate.

- Ne pas congeler.

## PRESENTATION :

Flacons en polyéthylène de 500 ml (2000 doses).

