



# CINTACUR

## SUSPENSION ORALE

### COMPOSITION

Praziquantel .....	2,50g
Sélénium (sf. Sélénite de sodium).....	0,05g
Excipient qsp.....	100ml

### PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Le **Praziquantel** est un anthelminthique de la famille des pyrazino-isoquinolines très actif sur les ténias. Son action s'exerce aussi bien sur les formes adultes et immatures. Sur le plan pharmacologique, le Praziquantel exerce son action de différentes manières dont notamment l'induction d'une contraction musculaire paralysante et la destruction du tégument du cestode. Il est rapidement absorbé par voie digestive chez toutes les espèces. Son métabolisme se fait de façon complète et rapide.

L'adjonction du **sélénium** dans la préparation vise à atténuer les effets des carences en cet oligoélément largement rencontrées dans les élevages ovins au Maroc.

### ESPECES CIBLES

Ovins et caprins

### INDICATIONS

Traitement du téniasis chez les espèces cibles.

### ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

**CINTACUR** est recommandé par voie orale à la dose unique de 2,00 ml de suspension/10 kg de poids vif, correspondant à 5,0 mg de Praziquantel.

### CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Il est déconseillé d'utiliser une autre source d'oligo-éléments durant l'usage de **CINTACUR**.

### EFFETS SECONDAIRES

Si les modalités d'utilisation générales sont respectées, & si les doses recommandées sont respectées, **CINTACUR** est bien toléré par les espèces cibles.

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Bien respecter la posologie recommandée.
- Bien agiter avant usage.
- Garder le produit hors du porté des enfants, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 15°C et 25 °C et HR de 60 % ± 10 %.
- Détruire le récipient après usage



**DELAI D'ATTENTE**

Nul

**CONDITIONS DE CONSERVATION**

- 2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25°C.
- Stabilité après ouverture du contenant: 3 Semaines
- 

**PRESENTATIONS:**

Flacons de 100ml, 250 ml ; 500 ml et 1L.