



OXTRA 50

POUDRE ORALE

COMPOSITION

Oxytétracycline (sf. chlorhydrate).....	50,0 g
Excipient q.s.p.....	100 g

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

OXTRA 50 est à base d'un antibactérien du groupe des tétracyclines, l'**oxytétracycline**. Celle-ci est caractérisée par son très large spectre d'activité qui englobe la plupart des germes pathogènes chez les animaux domestiques. L'**oxytétracycline** se caractérise par une bonne biodisponibilité par voie orale, un large volume de distribution permettant d'obtenir des concentrations tissulaires très élevées et une élimination en grande partie sous active par le rein et la bile.

ESPECES CIBLES

Volailles, veaux, agneaux et chevreaux.

INDICATIONS

Traitement des infections à germes sensibles à l'oxytétracycline chez les espèces cibles.

OXTRA 50 est particulièrement recommandée pour les cas suivants :

Volailles : Mycoplasmoses, coryza infectieux, sinusite du dindon, salmonelloses, choléra aviaire, omphalite, entérite infectieuse. Périodes de stress (refroidissement, vaccination,...).

Veaux, agneaux, chevreaux : Maladies infectieuses bactériennes et complications des maladies virales.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Chez la volaille et le Lapin : OXTRA 50 est à utiliser par voie orale dans l'eau de boisson à la dose de base de 20 mg de matière active/kg/jour.

Chez le veau, l'agneau et chevreau : OXTRA 50 est à utiliser par voie orale après dissolution dans l'eau à la dose de base de 10 mg de matière active/kg/12 heures pendant 3 à 8 jours consécutifs.



CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance hépatique ou rénale grave.

En raison des interactions avec les constituants du lait, il est déconseillé d'administrer **OXTRA 50** dans le lait.

Ne pas associer aux pansements digestifs à base de sels d'aluminium.

EFFETS SECONDAIRES

Si la dose est bien respectée, aucun effet indésirable ni secondaire n'est connu pour l'**oxytétracycline** par voie orale.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Bien mettre en solution avant l'administration.

Bien respecter la dose recommandée

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

DELAI D'ATTENTE

Viandes et abats : 7 jours

Œufs : nul

CONDITIONS DE CONSERVATION

Garder le produit dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Sachets de 1 Kg.