



OXYLA 20% **SOLUTION INJECTABLE**

COMPOSITION

Oxytétracycline (sf. dihydrate)	20,00 g
Excipient qsp.....	100ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

L'oxytétracycline (OTC), principe actif de la spécialité OXYLA 20 %, est un antibiotique de la famille des tétracyclines caractérisé par un spectre d'action très large qui englobe les germes gram positif et gram négatif, Actinomyces, spirochètes, mycoplasmes, chlamydie, et certains protozoaires. L'OTC est un antibiotique bactériostatique qui agit par inhibition de la synthèse protéique. La conception de OXYLA 20 % sous forme de formulation retard permet de réaliser une antibiothérapie complète en une seule injection. Cette propriété permet ainsi de remplacer, par une seule injection, les trois injections habituellement recommandées pour les formes conventionnelles.

ESPECES CIBLES

Bovins, Ovins et caprins.

INDICATIONS

Traitement des infections à germes sensibles à l'OTC chez les espèces cibles. Il s'agit essentiellement de :

- Bronchopneumonies infectieuses
- Gastroentérites infectieuses
- Avortements infectieux (chlamydie)
- Pathologie de l'appareil locomoteur (panaris, arthrites).
- Infections uro-génitales
- Anaplasmose,
- actinobacillose

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

OXYLA 20 % est recommandé par voie intramusculaire profonde à la dose de 20,0 mg de principe actif/kg de poids vif, soit 1 ml de solution/10 kg de poids vif.

Il est recommandé ne pas dépasser par site d'injection :

- 15 ml chez les bovins
- 5 ml chez les ovins et caprins

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance hépatique ou rénale grave.

Ne pas administrer aux sujets ayant manifestés une hypersensibilité aux tétracyclines.



Ne pas injecter par voie intraveineuse.
ne pas injecter des produits contenant du fer le même jour.

EFFETS SECONDAIRES

Une tuméfaction passagère peut être observée au site d'injection. Pour réduire l'intolérance locale du produit, il est recommandé de ne pas injecter par site plus de 15 ml chez les bovins et plus de 5 ml chez les ovins.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Utiliser le produit avec précaution chez les femelles en début de gestation.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

DELAI D'ATTENTE

Viande et abats : 21 jours
Lait : 7 jours (14 traites)

CONDITIONS DE CONSERVATION

- 2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25°C.
- Stabilité après ouverture du contenant: 4 Semaines

PRESENTATIONS:

Flacons de 50 ml et 100 ml.