



# ZURICOX

## SOLUTION ORALE

### COMPOSITION

Toltrazuril .....	2,50 g
Excipient q.s.p.....	100 ml

### PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Le **toltrazuril**, principe actif de la spécialité **ZURICOX**, est un anticoccidien du groupe des triazinones actif sur tous les stades intracellulaires du développement des coccidies. Le toltrazuril agit sur les schizontes (schizogonie) et les micro- et macrogamètes (gamétogonie). Le toltrazuril interfère avec la division du noyau de la coccidie et avec l'activité des mitochondries, et induit une vacuolisation sévère du réticulum endoplasmique du protozoaire.

Le **toltrazuril** n'interfère pas avec le développement de l'immunité anticoccidien, et son efficacité est indépendante de la sévérité de l'infection.

Le **toltrazuril** est également actif contre *Toxoplasma*, *Theileria* et *sarcocystis*.

Dans l'organisme, le **toltrazuril** est éliminé essentiellement dans les fèces sous forme inchangée ou oxydée (sulfoxyde et sulfone).

### ESPECES CIBLES

Volailles.

### INDICATIONS

Prévention et traitement des coccidioses aviaires dues à *Eimeria acervulina*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. maxima* et *E. mitis* chez le poulet et à *E. adenoides* et *E. meleagrimitis* chez la dinde.

### ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale dans l'eau de boisson à la posologie suivante :

Posologie de base : 7 mg de principe actif/kg de poids vif/j, soit 28 ml de solution ZURICOX par 100 kg par jour pendant 2 jours consécutifs.

Prévention : avant des périodes à haut risque (stress, vaccination, transport) en administration stratégique de 2 jours consécutifs.

Traitement : administration pendant 2 jours consécutifs en présence ou en absence d'anticoccidiens dans l'aliment.



## **CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS**

Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les œufs ou leurs dérivés sont destinés à la consommation humaine.

## **EFFETS SECONDAIRES**

Si les modalités d'utilisation générales sont respectées, aucun effet indésirable n'est observé après le traitement par le Toltrazuril.

## **PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Bien respecter la posologie indiquée.

Bien agiter avant l'emploi.

Bien se laver les mains après utilisation du produit.

Eviter tout contact avec la peau ;

En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin.

Garder le produit hors de portée des enfants.

## **DELAI D'ATTENTE**

Viandes et abats : 12 jour

Lait : sans objet

Œufs : Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les œufs ou leurs dérivés sont destinés à la consommation humaine

## **CONDITIONS DE CONSERVATION**

Garder le produit dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température  $\leq 25$  °C.

## **FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION**

Flacons de 500 ml et 1 litre